

■エンボス 輸液ポンプ用 mFOLFOX6+ベクティックス療法 (Day1)

【内科】【進行性・再発大腸癌】

(第 コース目)

*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:
医師名:	印
身長: cm	体重: kg
体表面積: m ²	Cr: mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 2週ごとを1コースとする

Day	1	2	8	9	~14
施行日	/	/	/	/	
ベクティックス	↓	休薬	休薬	休薬	
エルプラット	↓	休薬	休薬	休薬	
アイソボリン	↓	休薬	休薬	休薬	
5-FU	↓	↓	休薬	休薬	

■投与タイムテーブル

投与時間	
10時	イメンドカプセル125mg 1Cap デキサート注1.65mg 2A ポララミン注5mg 1A グラニセトロンバッグ 100mL 10分
10時10分	生食 50mL 10分
10時20分	●ベクティックス注【 】mg 生食 100mL 60分
11時20分	生食 50mL 10分
11時30分	●エルプラット注【 】mg 5%ブドウ糖 250mL 120分
11時30分	同時に 側管より ●アイソボリン注【 】mg 5%ブドウ糖 250mL 120分
13時30分	●①5-FU注【 】mg 生食 50mL 3分
13時33分	生食 50mL 10分フラッシュ
13時43分	●②5-FU注【 】mg 生食 250mL 約24時間 ※輸液ポンプを使用すること。

■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量
ベクティックス	6mg/kg
エルプラット注	85 mg/m ² mg/Body
アイソボリン注	200 mg/m ² mg/Body
①5-FU注	400 mg/m ² mg/Body
②5-FU注	1200 mg/m ² mg/Body

■注意・確認事項

- 点滴セットはフィルター付き輸液ルートを使用すること。
- ORAS遺伝子野生型であることを確認のうえ、オーダすること。
- イメンドcap125mg(レジメンオーダ)はday1に、イメンドcap80mg(内服オーダ)はday2,3に投与する。

入力薬剤師	看護師	看護師