

# S-1+ランダ療法 (Day8)

## 【内科】①-8【胃癌・食道癌・膵癌・胆道癌】

### (第 コース目)

\*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:
医師名:	印
身長: <span style="float: right;">cm</span>	体重: <span style="float: right;">kg</span>
体表面積: <span style="float: right;">m<sup>2</sup></span>	Cr: <span style="float: right;">mg/dL</span>

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 5週ごとを1コースとする

Day	1	7	8	9	15	22	29	~35
施行日	/	/	/	/	/	/	/	/
エスワン	経口: Day1-21							
ランダ	休薬	休薬	↓	休薬	休薬	休薬	休薬	

■投与タイムテーブル

投与時刻	
10時	イメンドカプセル125mg 1cap ソルデム3A 500mL <span style="float: right;">2時間</span>
12時	アロキシ注0.75mg 1V デキサート注6.6mg 1V デキサート注1.65mg 2A ソルデム3A 500mL <span style="float: right;">1時間</span>
13時	●ランダ【 <span style="background-color: yellow;">          </span> 】mg 生食 500mL <span style="float: right;">2時間</span>
15時	プロセミド注20mg 0.5A ソルデム3A 500mL <span style="float: right;">3時間</span>
18時	ソルデム3A 500mL <span style="float: right;">6時間</span> 翌日0時まで

■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量	※エスワンの1日投与量
ランダ	60 mg/m <sup>2</sup> mg/Body	<1.25      40mg × 2
エスワン	※参照	1.25-1.5      50mg × 2
		1.5 ≤      60mg × 2

入力 薬剤師	看護師	看護師

■注意・確認事項

- 腎毒性を予防するため投与日を含む前後日はハイドレーションを行うこと。
- エスワンは3週投与2週休薬
- イメンドcap125mg(レジメンオーダ)はday8に、  
イメンドcap80mg(内服オーダ)はday9,10に投与する。
- デカドロン錠8mg(内服オーダ)はday9,10,11に投与する。