

レミケード療法(関節リウマチ)【外来用】

【整形外科】①【関節リウマチ】

(第 コース目)

*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:
医師名:	印

身長:	cm	体重:	kg
体表面積:	m ²	Cr:	mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 週ごとを1コースとする

Day	1	~
施行日	/	
レミケード	↓	

■投与タイムテーブル

投与時間		
10時		ポララミン注 5mg 生食 100mL 30分
10時30分		●レミケード ()mg 生食 500mL 120分
12時30分		生食 50mL 10分フラッシュ

■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量
レミケード	3mg/kg 10mg/kgまで増量可能

■注意・確認事項

- 1.2ミクロン以下のメンブランフィルターを用いたインラインフィルターを通して投与すること
- 3回分は入院で施行(初回、2週後、6週後)
- 投与開始の30分はゆっくり投与する。問題がなければ徐々にスピードを上げる
- Infusion Reactionの発現に注意すること(発熱・血圧低下・アナフィラキシー様症状など)

■溶解時の注意事項

- バイアルを回転させながら緩やかに溶解し、溶解後は5分静置すること
- 注射針は22Gを使用すること

入力 薬剤師	看護師	看護師

