

S-1+ランダ療法 (Day7)

【内科】①-7【胃癌・食道癌・膵癌・胆道癌】

(第 コース目)

*網かけ部分は必須記入事項

| | |
|----------------------|-----------|
| 診療科: | 病棟: |
| 医師名: | 印 |
| 身長: cm | 体重: kg |
| 体表面積: m ² | Cr: mg/dL |

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 5週ごとを1コースとする

| | | | | | | | | |
|------|-------------|----|---|----|----|----|----|-----|
| Day | 1 | 7 | 8 | 9 | 15 | 22 | 29 | ~35 |
| 施行日 | / | / | / | / | / | / | / | |
| エスワン | 経口: Day1-21 | | | | | | | |
| ランダ | 休薬 | 休薬 | ↓ | 休薬 | 休薬 | 休薬 | 休薬 | |

■投与タイムテーブル

| | |
|------|-----------------------------|
| 投与時間 | |
| 14時 | ソルデム3A 500mL 4時間 |
| 18時 | ソルデム3A 500mL 4時間 ロックして終了 |

■投与量 ※投与量の参考

| 薬剤名 | 標準投与量 | ※エスワンの1日投与量 | |
|------|------------------------------|---------------|----------|
| ランダ | 60 mg/m ² mg/Body | <1.25 | 40mg × 2 |
| エスワン | ※参照 | 1.25- $<$ 1.5 | 50mg × 2 |
| | | 1.5 \leq | 60mg × 2 |

■注意・確認事項

- 腎毒性を予防するため投与日を含む前後日はハイドレーションを行うこと。
- エスワンは3週投与2週休薬
- イメンドcap125mg(レジメンオーダ)はday8に、
イメンドcap80mg(内服オーダ)はday9,10に投与する。
- デカドロン錠8mg(内服オーダ)はday9,10,11に投与する。

| | | |
|-----------|-----|-----|
| 入力 薬剤師 | 看護師 | 看護師 |
| | | |