

レミケード療法【外来用】【10mg/kg】

【内科】101【クローン病】

(第 コース目)

*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:
医師名:	印
身長: cm	体重: kg
体表面積: m ²	Cr: mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 週ごとを1コースとする

Day	1	~
施行日	/	
レミケード	↓	

■投与タイムテーブル

投与時間	
10時	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> ポララミン注 5mg 生食 100mL 30分 </div>
10時30分	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> ●レミケード【 】mg 生食 500mL 120分 </div>
12時30分	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 生食 50mL 10分フラッシュ </div>

■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量
レミケード	10mg/kg

■注意・確認事項

- 点滴セットはフィルター付き輸液ルートを使用すること。
- 3回分は入院で施行。(初回、2週後、6週後)
- 投与開始の30分はゆっくり投与する。問題がなければ徐々にスピードを上げる。
- Infusion Reactionの発現に注意すること。(発熱・血圧低下・アナフィラキシー様症状など)

■溶解時の注意事項

- バイアルを回転させながら緩やかに溶解し、溶解後は5分静置すること。
- 注射針は22Gを使用すること。

入力 薬剤師	看護師	看護師