

5-FU+ランダ療法 (Day1,8)

【内科】②-1, 8【胃癌・食道癌】

(第 コース目)

*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:
医師名:	印
身長: cm	体重: kg
体表面積: m ²	Cr: mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 3週ごとを1コースとする

Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	~21
施行日	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5-FU	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
ランダ	↓	↓	↓	↓	↓	休薬	休薬	↓	↓	↓	↓	↓	休薬	↓

■投与タイムテーブル

投与時間	
12時	イメンドカプセル125mg 1Cap 生食 50mL 全開
生食が 終わり次第	●5-FU ()mg ソルラクト 500mL 12時間
12時30分	側管より デキサート注6.6mg 1V デキサート注1.65mg 2A アロキシ注0.75mg 1V 生食 100mL 30分
13時	側管より ●ランダ ()mg 生食 500mL 120分
15時	側管より ソルデム3A 500mL 120分
	翌日0時まで

■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量
5-FU	320mg/m ² /day 但し、Day1,6,8,13は160mg/m ² /day
ランダ	4mg/m ² /day

- 注意・確認事項
- 腎障害予防のためにハイドレーションに留意すること
 - イメンドカプセル125mg(レジメンオーダ)はDay1,8に
イメンドカプセル80mg(内服オーダ)はDay2~5,9~12に投与する。

入力 薬剤師	看護師	看護師