

# 5-FU+ランダ療法 (Day6, 13)

## 【内科】②-6, 13【胃癌・食道癌】


### (第 コース目)

\*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:
医師名:	印
身長: cm	体重: kg
体表面積: m <sup>2</sup>	Cr: mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 3週ごとを1コースとする

Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	~21
施行日	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5-FU	↓	↓	↓	↓	↓	↓	休薬	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
ランダ	↓	↓	↓	↓	↓	休薬	休薬	↓	↓	↓	↓	↓	休薬	↓



■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量
5-FU	320mg/m <sup>2</sup> /day 但し、Day1,6,8,13は160mg/m <sup>2</sup> /day
ランダ	4mg/m <sup>2</sup> /day

- 注意・確認事項
- 腎障害予防のためにハイドレーションに留意すること
  - イメンドカプセル125mg(レジメンオーダ)はDay1,8に  
イメンドカプセル80mg(内服オーダ)はDay2~5,9~12に投与する。

入力 薬剤師	看護師	看護師