

FOLFIRI療法

【内科】32【進行性・再発大腸癌】

(第 コース目)

*網かけ部分は必須記入事項

診療科:		病棟:	
医師名:		印	
身長:	cm	体重:	kg
体表面積:	m ²	Cr:	mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 2週ごとを1コースとする

Day	1	2	8	9	~14
施行日	/	/	/	/	
カンプト	↓	休薬	休薬	休薬	
アイソボリン	↓	休薬	休薬	休薬	
5-FU	↓	↓	休薬	休薬	

■投与タイムテーブル

投与時間	
10時	イメンドカプセル125mg 1Cap デキサート注1.65mg 2A グラニセトロンバッグ 100mL 10分
10時10分	●カンプト注【 】mg 5%ブドウ糖 250mL 120分
10時10分	同時に 側管より ●アイソボリン注【 】mg 5%ブドウ糖 250mL 120分
12時10分	●①5-FU注【 】mg 生食 50mL 3分
12時13分	生食 50mL 10分フラッシュ
12時23分	●②5-FU注【 】mg 5%ブドウ糖 120mL 約46時間baxtar infusion pumpで
	翌々日10時まで

■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量	
カンプト注	150 mg/m ²	mg/Body
アイソボリン注	200 mg/m ²	mg/Body
①5-FU注	400 mg/m ²	mg/Body
②5-FU注	2400 mg/m ²	mg/Body

■注意・確認事項

○カンプトは腸閉塞患者には禁忌。

○イメンドcap125mg(レジメンオーダー)はday1に、
イメンドcap80mg(内服オーダー)はday2,3に投与する。

入力 薬剤師	看護師	看護師