

FP(肛門管癌)療法(Day1)

【内科】51-1【肛門管癌】 (第 コース目)

*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:		
医師名:	印		
身長:	cm	体重:	kg
体表面積:	m ²	Cr:	mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 4週ごとを1コースとする

Day	1	2	3	4	5	6	~28
施行日	/	/	/	/	/	/	/
ランダ	↓	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬	
5-FU	↓	↓	↓	↓	↓	(終)	

■投与タイムテーブル

投与時間	投与内容
10時	イメンドカプセル125mg 1Cap 生食 500mL 3時間
10時00分	デキサート注1.65mg 2A デキサート注6.6mg 1V アロキシ注0.75mg 1V 生食 100mL 30分
10時30分	KCL注10mEq 硫酸Mg補正液1mEq/mL 8mL 生食 500mL 60分
11時30分	20%マンニトール 300mL 30分
12時00分	●ランダ【 】mg 生食 500mL 60分
13時00分	●5-FU【 】mg テルモ生食 1000mL 24時間 ※輸液ポンプを使用すること
13時00分	KCL注10mEq 生食 500mL 60分

■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量
ランダ	80mg/m ² /day
5-FU	800mg/m ² /day

■注意・確認事項

- 中心静脈から投与すること。5-FU投与時は輸液ポンプを使用すること。
- 腎障害予防のためにハイドレーションに留意すること。
- イメンドカプセル125mg(レジメンオーダ)はDay1に
イメンドカプセル80mg(内服オーダ)はDay2,3に投与する。

入力 薬剤師	看護師	看護師