

FP(肛門管癌)療法 (Day4)

【内科】51-4【肛門管癌】 (第 コース目)

*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:
医師名:	印

身長:	cm	体重:	kg
体表面積:	m ²	Cr:	mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 4週ごとを1コースとする

Day	1	2	3	4	5	6	~28
施行日	/	/	/	/	/	/	/
ランダ	↓	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬	
5-FU	↓	↓	↓	↓	↓	(終)	

■投与タイムテーブル

投与時間	
10時00分	<div style="text-align: center;"> <p>↓</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> デキサート注6.6mg 1V 生食 100mL </div> <p>← 30分</p> </div>
13時00分	<div style="text-align: center;"> <p>↓</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> ●5-FU 【 】mg テルモ生食 1000mL </div> <p>24時間 ※輸液ポンプを使用すること</p> <p>↓</p> </div>

■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量
ランダ	80mg/m ² /day
5-FU	800mg/m ² /day

- 注意・確認事項
- 中心静脈から投与すること。5-FU投与時は輸液ポンプを使用すること。
 - 腎障害予防のためにハイドレーションに留意すること。
 - イメンドカプセル125mg(レジメンオーダ)はDay1に
イメンドカプセル80mg(内服オーダ)はDay2,3に投与する。

入力 薬剤師	看護師	看護師