

# FP(肛門管癌)療法 (Day5)

## 【内科】51-5【肛門管癌】

### (第 コース目)

\*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:
医師名:	印

身長:	cm	体重:	kg
体表面積:	m <sup>2</sup>	Cr:	mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 4週ごとを1コースとする

Day	1	2	3	4	5	6	~28
施行日	/	/	/	/	/	/	/
ランダ	↓	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬	
5-FU	↓	↓	↓	↓	↓	(終)	

■投与タイムテーブル

投与時間	
10時00分	<div style="text-align: center;">             ↓              デキサート注6.6mg 1V              生食 100mL 30分           </div>
13時00分	<div style="text-align: center;">             ●5-FU 【      】mg              テルモ生食 1000mL 24時間 ※輸液ポンプを使用すること           </div>
5FU投与終了後	<div style="text-align: center;">             ↓              生食 50mL フラッシュ用           </div>

■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量
ランダ	80mg/m <sup>2</sup> /day
5-FU	800mg/m <sup>2</sup> /day

- 注意・確認事項
- 中心静脈から投与すること。5-FU投与時は輸液ポンプを使用すること。
  - 腎障害予防のためにハイドレーションに留意すること。
  - イメンドカプセル125mg(レジメンオーダ)はDay1に  
イメンドカプセル80mg(内服オーダ)はDay2,3に投与する。

入力 薬剤師	看護師	看護師