

# パクリタキセル+パラプラチン療法

## 【内科】54【肛門管癌】 (第 コース目)

\*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:
医師名:	印

身長:	cm	体重:	kg
体表面積:	m <sup>2</sup>	Cr:	mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 3週ごとを1コースとする

Day	1	8	15	~21
施行日	/	/	/	
パクリタキセル	↓	休薬	休薬	
パラプラチン	↓	休薬	休薬	

### ■投与タイムテーブル

投与時間		
10時		イメンドカプセル125mg 1Cap 5%ブドウ糖 250mL 60分
10時		同時に 側管より 内服薬レスタミン10mg 5T デキサート注6.6mg 1V デキサート注1.65mg 2A ガスター注20mg 1A グラニセトロンバッグ 100mL 30分
10時		
11時		●パクリタキセル【 】mg 5%ブドウ糖 500mL 180分
14時		●パラプラチン【 】mg 5%ブドウ糖 250mL 60分
15時		生食 50mL 10分フラッシュ

### ■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量
パクリタキセル	175 mg/m <sup>2</sup>
パラプラチン	AUC=6

入力 薬剤師	看護師	看護師

### ■注意・確認事項

- パクリタキセル投与中はアレルギー発現に注意すること。特に投与開始10分以内は頻回に観察すること。
- 過敏症予防の前投薬を終了して30分以上経っているのを確認してからパクリタキセルを投与すること。
- 点滴セットはフィルター付き輸液ルートを使用すること。

○イメンドcap125mg(レジメンオーダ)はday1に、  
イメンドcap80mg(内服オーダ)はday2,3に投与する。