

SOX+ベクティビックス療法

【内科】55【進行性・再発大腸癌】

(第 コース目)

*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:		
医師名:	印		
身長:	cm	体重:	kg
体表面積:	m ²	Cr:	mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 3週ごとを1コースとする

Day	1	8	15	~21
施行日	/	/	/	/
ベクティビックス	↓	休薬	休薬	休薬
エルプラット	↓	休薬	休薬	休薬
エスワン	経口:Day1(夕)~Day15(朝)			

■投与タイムテーブル

投与時間	
10時00分	イメンドカプセル125mg 1Cap デキサート注1.65mg 2A ポララミン注5mg 1A グラニセトンバッグ 100mL 10分
10時10分	生食 50mL 10分
10時20分	●ベクティビックス注【 】mg 生食 100mL 60分
11時20分	生食 50mL 10分
11時30分	●エルプラット注【 】mg デキサート注1.65mg 1A 5%ブドウ糖 500mL 120分
13時30分	生食 50mL 10分 フラッシュ

■投与量

※投与量の参考

薬剤名	標準投与量	※エスワンの1日投与量
ベクティビックス注	6mg/kg	<1.25 80mg/Body/分2
エルプラット注	130 mg/m ² mg/Body	1.25~<1.5 100mg/Body/分2
エスワン	※投与量の参考	1.5≤ 120mg/Body/分2

入力 薬剤師	看護師	看護師

■注意・確認事項

- エスワンは2週投与1週休薬。
- エルプラット注は塩化物・塩基性溶液との混和は不可。
- RAS遺伝子野生型であることを確認のうえ、オーダすること。
- イメンドcap125mg(レジメンオーダ)はday1に、イメンドcap80mg(内服オーダ)はday2,3に投与する。