

# テセントリク+カルボプラチン+ペプシド【30分】療法 (Day1)

## 【呼吸器科】101-1【小細胞肺癌】

### (第 コース目)

\*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:
医師名:	印

身長:	cm	体重:	kg
体表面積:	m <sup>2</sup>	Cr:	mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 3週ごとを1コースとする

Day	1	2	3	~21
施行日	/	/	/	
テセントリク	↓	休薬	休薬	
カルボプラチン	↓	休薬	休薬	
ペプシド	↓	↓	↓	

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

滴下順	
①	生食 50mL 10分
②	●テセントリク【 】mg 生食 250mL 30分
③	生食 50mL 10分
④	デキサート注1.65mg 2A アロカリス注235mg 1V グラニセトロンバッグ 100mL 30分
⑤	●カルボプラチン【 】mg 5%ブドウ糖 250mL 1時間
⑥	●ペプシド【 】mg 生食 500mL 1時間30分
⑦	生食 50mL 10分フラッシュ

■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量
テセントリク	1200mg/body
カルボプラチン	AUC=5 mg/Body
ペプシド	100 mg/m <sup>2</sup> mg/Body

入力 薬剤師	看護師	看護師

■注意・確認事項

- 点滴セットはフィルター付き輸液ルートを使用すること。
- テセントリクは初回投与の忍容性が良好であれば、2回目以降の投与時間は30分間まで短縮できる。