

[short hydration (適応: 75歳未満)]

■エンボス

## ADOC(SH)療法 (Day4)

### 【呼吸器科】104-4【胸腺腫・胸腺癌】

### (第 コース目)

\*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:
医師名:	印
身長: cm	体重: kg
体表面積: m <sup>2</sup>	Cr: mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 3週ごとを1コースとする

Day	1	2	3	4	~21
施行日	/	/	/	/	/
ドキシソルピシン	↓	休薬	休薬	休薬	
ランダ	↓	休薬	休薬	休薬	
オンコビン	休薬	休薬	↓	休薬	
エンドキサン	休薬	休薬	休薬	↓	

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

滴下順	
①	生食 50mL 10分
②	●エンドキサン【 】mg 生食 500mL 2時間
③	生食 50mL 10分 フラッシュ

■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量	
ドキシソルピシン	40mg/m <sup>2</sup>	mg/Body
ランダ	50mg/m <sup>2</sup>	mg/Body
オンコビン	0.6mg/m <sup>2</sup> (MAX 2mg/Body)	mg/Body
エンドキサン	700mg/m <sup>2</sup>	mg/Body

入力 薬剤師	看護師	看護師

■注意・確認事項

- 75歳未満の患者を対象とする。
- ドキシソルピシン注の総投与量は500mg/m<sup>2</sup>以下とする。
- 心毒性に注意。
- 腎障害予防のためにハイドレーションに留意すること。
- デカドロン錠8mg(内服オーダ)はday2,3,4に投与する。
- 糖尿病でないことを確認し、必要に応じてジプレキサ錠5mg(内服オーダ)をday1,2,3,4に投与する。