

# ハーセプチン+ゼローダ+ランダ療法【30分】(Day3)

【外科】104-3【胃癌】

(第 コース目)

■エンボス

\*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:
医師名:	印

身長:	cm	体重:	kg
体表面積:	m <sup>2</sup>	Cr:	mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 3週ごとを1コースとする

Day	1	2	3	16	~21
施行日	/	/	/		
ハーセプチン	休薬	↓	休薬	休薬	
ゼローダ	休薬	経口: Day2(夕)~Day16(朝)			
ランダ	休薬	↓	休薬	休薬	

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

滴下順	
前日より ①	前日より持続点滴 ソルデム3A 500mL 6時間
②	ソルデム3A 500mL 6時間
③	ソルデム3A 500mL 6時間

■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量
ハーセプチン	6 mg/kg mg/Body ※ハーセプチンは1コース目の初回のみ8mg/kgで投与
ゼローダ	2000mg/m <sup>2</sup> /分2
ランダ	80 mg/m <sup>2</sup> mg/Body

■注意・確認事項

- 腎毒性を予防するため投与日を含む前後日はハイドレーションを行うこと。
- ゼローダは2週投与1週休薬
- ハーセプチンは初回投与の忍容性が良好であれば、2回目以降の投与時間は30分間まで短縮できる。
- デカドロン錠8mg(内服オーダ)はday3,4,5に投与する。
- 糖尿病でないことを確認し、必要に応じてジプレキサ錠5mg(内服オーダ)をday2,3,4,5に投与する。

入力 薬剤師	看護師	看護師