

CAMP療法 (Day2~4)

【呼吸器科】105-2~4【胸腺腫・胸腺癌】

(第 コース目)

*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:
医師名:	印
身長:	cm
体重:	kg
体表面積:	m²
Cr:	mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 3~4週ごとを1コースとする

Day	1	2	3	4	5	6	~21or28
施行日	/	/	/	/	/	/	/
ドキソルビシン	↓	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬	
ランダ	↓	↓	↓	↓	休薬	休薬	
ソル・メドロール1000mg	↓	↓	↓	↓	休薬	休薬	
ソル・メドロール500mg	休薬	休薬	休薬	休薬	↓	↓	

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

滴下順		
※①		イメンドカプセル80mg 1Cap
※①		ソル・メドロール注1000mg 1V グラニセトロンバッグ 100mL 30分
②		●ランダ【 】mg 生食 500mL 1時間30分
③		フロセミド注20mg 1A 生食 500mL 1時間30分
④		ソルデム3A 500mL 1時間30分

■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量	
ドキソルビシン	40 mg/m ²	mg/Body
ランダ	20 mg/m ²	mg/Body

■注意・確認事項

- ドキソルビシン注の総投与量は500mg/m²以下とする。
- 心毒性に注意。
- 腎障害予防のためにハイドレーションに留意すること。
- イメンドcap125mg(レジメンオーダ)はday1に、
イメンドcap80mg(内服オーダ)はday2~5に投与する。
- 糖尿病でないことを確認し、必要に応じてジプレキサ錠5mg(内服オーダ)をday1,2,3,4に投与する。

入力 薬剤師	看護師	看護師