

[short hydration (適応: 75歳未満)]

■エンボス

**イミフィンジ+ランダ+ベプシド(SH)療法(Day1)**

**【呼吸器科】107-1【小細胞肺癌】**

**(第 コース目)**

\*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:
医師名:	印
身長: cm	体重: kg
体表面積: m <sup>2</sup>	Cr: mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 3週ごとを1コースとする

Day	1	2	3	~21
施行日	/	/	/	
イミフィンジ	↓	休薬	休薬	
ランダ	↓	休薬	休薬	
ベプシド	↓	↓	↓	

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

滴下順	
①	生食 50mL 10分
②	●イミフィンジ【 】mg 生食 100mL 1時間
③	生食 50mL 10分
④	パロノセトロン注0.75mg 1V アロカリス注235mg 1V デキサート注1.65mg 2A デキサート注6.6mg 1V 生食 100mL 30分
⑤	●ベプシド【 】mg 生食 500mL 1時間
⑥	KCL注10mEq 硫酸Mg補正液1mEq/mL 8mL 生食 500mL 1時間
⑦	マンニトールS 300mL 30分
⑧	●ランダ【 】mg 生食 500mL 1時間
⑨	KCL注10mEq 生食 500mL 1時間

■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量	
イミフィンジ	1500 mg/Body	mg/Body
ランダ	80 mg/m <sup>2</sup>	mg/Body
ベプシド	100 mg/m <sup>2</sup>	mg/Body

入力 薬剤師	看護師	看護師

■注意・確認事項

- 75歳未満の患者を対象とする。
- 点滴セットはフィルター付き輸液ルートを使用すること。
- 腎機能に応じて、副作用軽減のために点滴を追加すること。
- 体重30kg以下の場合、イミフィンジの1回投与量は20mg/kgとする。
- デカドロン錠8mg(内服オーダ)はday2,3,4に投与する。
- 糖尿病でないことを確認し、必要に応じてジプレキサ錠5mg(内服オーダ)をday1,2,3,4に投与する。