

■エンボス

【2コース目】オプジーボ(NIVO)+ヤーボイ(IPI)+パクリタキセル(PTX)+カルボプラチン(CBDCA)療法

(電子カルテ名称:【2コース目】NIVO+IPI+PTX+CBDCA)

【呼吸器科】119【非小細胞肺癌】
(第 コース目)

*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:
医師名:	印

身長:	cm	体重:	kg
体表面積:	m ²	Cr:	mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール :3週ごとを1コースとする

Day	1	8	15	~21
施行日	/	/	/	/
オプジーボ	↓	休薬	休薬	
ヤーボイ	休薬	休薬	休薬	
パクリタキセル	↓	休薬	休薬	
カルボプラチン	↓	休薬	休薬	

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

滴下順	
①	生食 50mL 10分
②	●オプジーボ注【 】mg 生食 100mL 30分
③	生食 50mL 10分
※④	5%ブドウ糖 250mL 1時間
※④	同時に 側管より 内服薬レスタミン10mg 5T アロカリス注235mg 1V デキサート注6.6mg 1V デキサート注1.65mg 2A ガスター注20mg 1A グラニセトロンバッグ 100mL 30分
※④	
⑤	●パクリタキセル【 】mg 5%ブドウ糖 500mL 3時間
⑥	●カルボプラチン【 】mg 5%ブドウ糖 250mL 1時間
⑦	生食 50mL 10分フラッシュ

■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量	
オプジーボ	360mg/body	
ヤーボイ	1mg/kg	mg/Body
パクリタキセル	200mg/m ²	mg/Body
カルボプラチン	AUC=6	mg/Body

入力 薬剤師	看護師	看護師

■注意・確認事項

- 点滴セットはフィルター付き輸液ルートを使用すること。
- 外来から初回導入となる場合は、インフュージョンリアクションの観察の為、点滴終了1時間後に医師の診察を受け、帰宅の許可を得ること。
- パクリタキセル投与中はアレルギー発現に注意すること。特に投与開始10分以内は頻回に観察すること。
- 過敏症予防の前投薬を終了して30分以上経っているのを確認してからパクリタキセルを投与すること。