

S-1+ランダ+ハーセプチン(持続)療法【30分】(Day3)

■エンボス

【外科】122-3【胃癌】
 (第 コース目)

*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:
医師名:	印

身長:	cm	体重:	kg
体表面積:	m ²	Cr:	mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 3週ごとを1コースとする

Day	1	2	3	15	~21
施行日	/	/	/	/	/
エスワン	休薬	経口: Day2-Day15			
ランダ	休薬	↓	休薬	休薬	
ハーセプチン	休薬	↓	休薬	休薬	

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

滴下順	
前日より ①	前日より持続点滴 ソルテム3A 500mL 6時間
②	ソルテム3A 500mL 6時間
③	ソルテム3A 500mL 6時間

■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量	
エスワン	※参照	
ランダ	60 mg/m ²	mg/Body
ハーセプチン	6 mg/kg	mg/Body

※エスワンの1日投与量
 BSA<1.25 80mg/日
 1.25≤BSA<1.5 100mg/日
 1.5≤BSA 120mg/日

※ハーセプチンは1コース目の初回のみ8mg/kgで投与

■注意・確認事項

- 腎毒性を予防するため投与日を含む前後日はハイドレーションを行うこと。
- エスワンは2週連日投与、1週休薬。
- ハーセプチンは初回投与の忍容性が良好(infusion reaction等が発生していない)であれば、2回目以降の投与時間は30分間まで短縮できる。

○デカドロン錠8mg(内服オーダ)はday3,4,5に投与する。

○糖尿病でないことを確認し、必要に応じてジプレキサ錠5mg(内服オーダ)をday2,3,4,5に投与する。

入力 薬剤師	看護師	看護師