

イミフィンジ+イジユド+ペメトレキセド(PEM)+カルボプラチン(CBDCA)療法

(電子カルテ名称:イミフィンジ+イジユド+PEM+CBDCA)

【呼吸器科】131【非小細胞肺癌】
(第 コース目)

*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:
医師名:	印

身長:	cm	体重:	kg
体表面積:	m ²	Cr:	mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール :3週ごとを1コースとする

Day	-8	1	8	15	~21
施行日	/	/	/	/	/
イミフィンジ		↓	休薬	休薬	
イジユド		↓	休薬	休薬	
ペメトレキセド		↓	休薬	休薬	
カルボプラチン		↓	休薬	休薬	
パンビタン末(経口)	初回投与の7日以上前から薬酸として1日1回0.5mgを連日経口投与する。				
メコバラミン注(筋注)	↓				

メコバラミン注(ビタミンB12): 初回投与の少なくとも7日前に、1回1mgを筋肉内投与する。その後、9週毎(3コース毎)に1回投与する。

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

滴下順	
①	生食 50mL 10分
②	●イミフィンジ【 】mg 生食 100mL 1時間
③	生食 50mL 10分
④	●イジユド【 】mg 生食 100mL 1時間
⑤	生食 50mL 10分
⑥	デキサート注1.65mg 2A アロカリス注235mg 1V グラニセトロンバッグ 100mL 30分
⑦	●ペメトレキセド【 】mg 生食 100mL 10分
⑧	●カルボプラチン【 】mg 5%ブドウ糖液 250mL 1時間
⑨	生食 50mL 10分 フラッシュ

■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量	
イミフィンジ	1500mg/Body	
イジユド	75mg/Body	
ペメトレキセド	500 mg/m ²	mg/Body
カルボプラチン	AUC=6	mg/Body

入力薬剤師	看護師	看護師

■注意・確認事項

- 点滴セットはフィルター付き輸液ルートを使用すること。
- 外来から初回導入となる場合は、インフュージョンリアクションの観察の為、点滴終了1時間後に医師の診察を受け、帰宅の許可を得ること。
- NSAIDsとの併用は注意して下さい。
- 1週間以上前から薬酸を服用していることと、ビタミンB12の筋肉内注射投与を受けたことを確認すること。
- 体重30kg以下の場合、イミフィンジの1回投与量は20mg/kgとする。