

# Bi-weeklyドセタキセル療法

## 【外科】⑩【胃癌・食道癌】

### (第 コース目)

\*網かけ部分は必須記入事項

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| 診療科:                 | 病棟:       |
| 医師名:                 | 印         |
| 身長: cm               | 体重: kg    |
| 体表面積: m <sup>2</sup> | Cr: mg/dL |

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 4週ごとを1コースとする

|        |   |    |    |    |     |
|--------|---|----|----|----|-----|
| Day    | 1 | 8  | 15 | 22 | ~28 |
| 施行日    | / | /  | /  | /  |     |
| ドセタキセル | ↓ | 休薬 | ↓  | 休薬 |     |

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

|                                   |   |                                   |          |
|-----------------------------------|---|-----------------------------------|----------|
| 滴下順                               |   |                                   |          |
| ①                                 | <table border="1"> <tr> <td>デキサート注6.6mg 1V<br/>生食 100mL</td> <td>30分</td> </tr> </table>        | デキサート注6.6mg 1V<br>生食 100mL        | 30分      |
| デキサート注6.6mg 1V<br>生食 100mL        | 30分   |                                   |          |
| ②                                 | <table border="1"> <tr> <td>●ドセタキセル【      】mg<br/>5%ブドウ糖 250mL</td> <td>1時間</td> </tr> </table> | ●ドセタキセル【      】mg<br>5%ブドウ糖 250mL | 1時間      |
| ●ドセタキセル【      】mg<br>5%ブドウ糖 250mL | 1時間   |                                   |          |
| ③                                 | <table border="1"> <tr> <td>生食 50mL</td> <td>10分フラッシュ</td> </tr> </table>                       | 生食 50mL                           | 10分フラッシュ |
| 生食 50mL                           | 10分フラッシュ  |                                   |          |

■投与量 ※投与量の参考

| 薬剤名    | 標準投与量                |         |
|--------|----------------------|---------|
| ドセタキセル | 40 mg/m <sup>2</sup> | mg/Body |

■注意・確認事項

|           |     |     |
|-----------|-----|-----|
| 入力<br>薬剤師 | 看護師 | 看護師 |
|           |     |     |