

SOX+アービタックス療法【1コース目:Day1】

【外科】166-1【進行性・再発大腸癌】

(第 コース目)

*網かけ部分は必須記入事項

| | |
|----------------------|-----------|
| 診療科: | 病棟: |
| 医師名: | 印 |
| 身長: cm | 体重: kg |
| 体表面積: m ² | Cr: mg/dL |

■ レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 3週ごとを1コースとする

| | | | | |
|---------|----------------------|----|----|-----|
| Day | 1 | 8 | 15 | ~21 |
| 施行日 | / | / | / | |
| アービタックス | ↓ | ↓ | ↓ | |
| エルプラット | | 休薬 | 休薬 | |
| エスワン | 経口: Day1(夕)~Day15(朝) | | | |

■ 投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

| 滴下順 | |
|-----|---|
| ① | アロカリス注235mg 1V デキサート注1.65mg 2A ポララミン注5mg 1A グラニセロンバッグ 100mL 30分 |
| ② | ●アービタックス【 】mg 生食 250mL 2時間 |
| ③ | 生食 100mL 30分 |
| ④ | ●エルプラット注【 】mg 5%ブドウ糖 500mL デキサート注1.65mg 1A 2時間 |
| ⑤ | 生食 50mL 10分フラッシュ |

■ 投与量 ※投与量の参考

| 薬剤名 | 標準投与量 |
|----------------|-------------------------------|
| アービタックス(初回) | 400mg/m ² mg/Body |
| アービタックス(2回目以降) | 250mg/m ² mg/Body |
| エルプラット注 | 130 mg/m ² mg/Body |
| エスワン | ※投与量の参考 |

※エスワンの1日投与量

| | |
|-----------|---------------|
| <1.25 | 80mg/Body/分2 |
| 1.25~<1.5 | 100mg/Body/分2 |
| 1.5≤ | 120mg/Body/分2 |

■ 注意・確認事項

- エスワンは2週投与1週休薬。
- アービタックス投与中又は24時間以内にinfusion reactionが起こる場合があるので注意すること。
- アービタックスは1コース目の初回のみ400mg/m²で投与。それ以降は250mg/m²で投与。
- エルプラットは塩化物・塩基性溶液との混和は不可

| | | |
|-----------|-----|-----|
| 入力 薬剤師 | 看護師 | 看護師 |
| | | |