

SOX+アービタックス療法【Day8,15】

【外科】166-8,15【進行性・再発大腸癌】

(第 コース目)

*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:
医師名:	印

身長:	cm	体重:	kg
体表面積:	m ²	Cr:	mg/dL

■ **レジメン** 下記が1コースの投与スケジュール : 3週ごとを1コースとする

Day	1	8	15	~21
施行日	/	/	/	
アービタックス	↓	↓	↓	
エルプラット		休薬	休薬	
エスワン	経口: Day1(夕)~Day15(朝)			

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

滴下順		
①		ポララミン注5mg 1A デキサート注1.65mg 2A 生食 100mL 30分
②		●アービタックス【 】mg 生食 250mL 1時間
③		生食 100mL 30分

■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量	
アービタックス(初回)	400mg/m ²	mg/Body
アービタックス(2回目以降)	250mg/m ²	mg/Body
エルプラット注	130 mg/m ²	mg/Body
エスワン	※投与量の参考	

※エスワンの1日投与量

<1.25	80mg/Body/分2
1.25- $<$ 1.5	100mg/Body/分2
1.5 \leq	120mg/Body/分2

■注意・確認事項

- エスワンは2週投与1週休薬。
- アービタックス投与中又は24時間以内にinfusion reactionが起こる場合があるので注意すること。
- アービタックスは1コース目の初回のみ400mg/m²で投与。それ以降は250mg/m²で投与。

入力 薬剤師	看護師	看護師