

# ハーセプチン+XELOX療法【2コース目以降:30分】

【外科】179【胃癌】

(第 コース目)

\*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:
医師名:	印
身長: cm	体重: kg
体表面積: m <sup>2</sup>	Cr: mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 3週ごとを1コースとする

Day	1	8	15	~21
施行日	/	/	/	/
ハーセプチン	↓	休薬	休薬	
エルプラット	↓	休薬	休薬	
ゼローダ	経口:Day1(夕)~Day15(朝)			

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

滴下順	
①	アロカリス注235mg 1V デキサート注1.65mg 2A グラニセロンバッグ 100mL 30分
②	●ハーセプチン【     】mg 注射用水 20mL 生食 250mL 30分
③	●エルプラット注【     】mg 5%ブドウ糖 500mL デキサート注1.65mg 1A 2時間
④	生食 50mL 10分 フラッシュ

■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量	
ハーセプチン	6 mg/kg	mg/Body
エルプラット注	130 mg/m <sup>2</sup>	mg/Body
ゼローダ錠	2000 mg/m <sup>2</sup> /分2	mg/Body

※ハーセプチンは1コース目の初回のみ8mg/kgで投与

■注意・確認事項

- ゼローダは2週投与1週休薬
- 初回投与は入院にて行うこと。
- 初回投与前、初回3~6ヶ月毎に心エコーを行うこと。
- ハーセプチンは初回投与の忍容性が良好であれば、2回目以降の投与時間は30分間まで短縮できる。
- エルプラット注は塩化物・塩基性溶液との混和は不可。

入力 薬剤師	看護師	看護師