

新 FP療法(radiation併用)(Day4)

【外科】186-4【食道癌】 (第 コース目)

*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:
医師名:	印

身長:	cm	体重:	kg
体表面積:	m ²	Cr:	mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 4週ごとを1コースとする

Day	1	2	3	4	5	~28
施行日	/	/	/	/	/	/
ランダ	↓	休薬	休薬	休薬	休薬	
5-FU	↓	↓	↓	↓	(終)	

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

滴下順	
①	<div style="text-align: center;"> <p>↓</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> デキサート注6.6mg 1V 生食 100mL </div> <p>← 30分</p> </div>
②	<div style="text-align: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> ●5-FU ()mg テルモ生食 1000mL </div> <p>24時間 ※輸液ポンプを使用すること</p> </div>
③ 5FU投与終了後	<div style="text-align: center;"> <p>↓</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 生食 50mL </div> <p>フラッシュ用</p> </div>

■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量
ランダ	70mg/m ² /day
5-FU	700mg/m ² /day

- 注意・確認事項
- 中心静脈から投与すること。5-FU投与時は輸液ポンプを使用すること。
 - 腎障害予防のためにハイドレーションに留意すること。
 - 糖尿病でないことを確認し、必要に応じてジプレキサ錠5mg(内服オーダ)をday1,2,3,4に投与する。

入力 薬剤師	看護師	看護師