

キイトルーダ+ジェムザール+カルボプラチン療法(Day1)

【外科】224-1【乳癌】

(第 コース目)

*網かけ部分は必須記入事項

| | |
|------|-----|
| 診療科: | 病棟: |
| 医師名: | 印 |

| | | | |
|-------|----------------|-----|-------|
| 身長: | cm | 体重: | kg |
| 体表面積: | m ² | Cr: | mg/dL |

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール :3週ごとを1コースとする

| Day | 1 | 8 | 15 | ~21 |
|---------|---|----|----|-----|
| 施行日 | / | / | / | / |
| キイトルーダ | ↓ | 休薬 | 休薬 | |
| ジェムザール | ↓ | ↓ | 休薬 | |
| カルボプラチン | ↓ | ↓ | 休薬 | |

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

| 滴下順 | |
|-----|---|
| ① | 生食 50mL 10分 |
| ② | ●キイトルーダ【 】mg 生食 50mL 30分 |
| ③ | 生食 50mL 10分 |
| ④ | パロノセトロン注0.75mg 1V デキサート注6.6mg 1V 生食 100mL 30分 |
| ⑤ | ●ジェムザール【 】mg 生食 100mL 30分 |
| ⑥ | ●カルボプラチン【 】mg 5%ブドウ糖液 250mL 1時間 |
| ⑦ | 生食 50mL 10分 フラッシュ |

■投与量 ※投与量の参考

| 薬剤名 | 標準投与量 |
|---------|--------------------------------|
| キイトルーダ | 200mg/Body |
| ジェムザール | 1000 mg/m ² mg/Body |
| カルボプラチン | AUC=2 mg/Body |

■注意・確認事項

- 点滴セットはフィルター付き輸液ルートを使用すること。
- ジェムザール投与は30分前後で投与する。(60分以上かかると副作用が増強した例が報告されている。)
- 必要に応じてデカドロン錠8mg(内服オーダ)はday2,3,9,10に経口投与する。

| | | |
|-----|-----|-----|
| 薬剤師 | 看護師 | 看護師 |
| | | |