

パージェタ+ハーセプチン療法【初回】

【外科】231【進行性・再発大腸癌】

(第 コース目)

■エンボス

*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:
医師名:	印

身長:	cm	体重:	kg
体表面積:	m ²	Cr:	mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 3週ごとを1コースとする

Day	1	8	15	~21
施行日	/	/	/	
パージェタ	↓	休薬	休薬	
ハーセプチン	↓	休薬	休薬	

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

滴下順					
①	<table border="1"> <tr> <td>デキサート注6.6mg 1V</td> <td rowspan="2">10分</td> </tr> <tr> <td>生食 50mL</td> </tr> </table>	デキサート注6.6mg 1V	10分	生食 50mL	
デキサート注6.6mg 1V	10分				
生食 50mL					
②	<table border="1"> <tr> <td>●パージェタ【 】mg</td> <td rowspan="2">1時間</td> </tr> <tr> <td>生食 250mL</td> </tr> </table>	●パージェタ【 】mg	1時間	生食 250mL	
●パージェタ【 】mg	1時間				
生食 250mL					
③	<table border="1"> <tr> <td>●ハーセプチン【 】mg</td> <td rowspan="3">1時間30分</td> </tr> <tr> <td>注射用水 20mL</td> </tr> <tr> <td>生食 250mL</td> </tr> </table>	●ハーセプチン【 】mg	1時間30分	注射用水 20mL	生食 250mL
●ハーセプチン【 】mg	1時間30分				
注射用水 20mL					
生食 250mL					
④	<table border="1"> <tr> <td>生食 50mL</td> <td>10分 フラッシュ</td> </tr> </table>	生食 50mL	10分 フラッシュ		
生食 50mL	10分 フラッシュ				

■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量	
パージェタ		840mg/Body
ハーセプチン	8 mg/kg	mg/Body

■注意・確認事項

○パージェタ、ハーセプチンは忍容性が良好であれば、2回目以降の投与時間は30分に短縮可能。

入力 薬剤師	看護師	看護師