

ランダ+ベブシド療法(Day1)

【呼吸器科】27-1【小細胞肺癌】

(第 コース目)

*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:
医師名:	印

身長:	cm	体重:	kg
体表面積:	m ²	Cr:	mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール :3~4週ごとを1コースとする

Day	1	2	3	~21or28
施行日	/	/	/	
ランダ	↓	休薬	休薬	
ベブシド	↓	↓	↓	

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

滴下順	
①	生食 500mL 1時間30分
②	アロカリス注235mg 1V パロノセトロン注0.75mg 1V デキササート注1.65mg 2A デキササート注6.6mg 1V 生食 100mL 30分
③	●ベブシド【 】mg 生食 500mL 1時間30分
④	●ランダ【 】mg 生食 500mL 2時間
⑤	ソルテム3A 500mL 1時間30分
⑥	マンニトールS 300mL 1時間
⑦	フロセミド注20mg 1A 生食 500mL 1時間30分

■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量	
ランダ	80 mg/m ²	mg/Body
ベブシド	100 mg/m ²	mg/Body

入力 薬剤師	看護師	看護師

■注意・確認事項

○ベブシド注は投与量が200mg(0.4mg/mL)を超えると結晶が析出することがある。

○デカドロン錠8mg(内服オーダ)はday2,3,4に投与する。

○糖尿病でないことを確認し、必要に応じてジプレキサ錠5mg(内服オーダ)をday1,2,3,4に投与する。