

■エンボス

ジェムザール+カルボプラチン療法 (Day1)

【泌尿器科】30-1【尿路上皮癌】

(第 コース目)

*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:
医師名:	印

身長:	cm	体重:	kg
体表面積:	m ²	Cr:	mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 4週ごとを1コースとする

Day	1	2	8	15	22	~28
施行日	/	/	/	/		
ジェムザール	↓	休薬	↓	↓	休薬	
カルボプラチン	休薬	↓	休薬	休薬	休薬	

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

滴下順	
①	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">デキサート注6.6mg 1V</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">生食 100mL</div> 30分
②	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">●ジェムザール【 】mg</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">生食 100mL</div> 30分
③	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">生食 50mL</div> 10分フラッシュ
④	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">ヘパリンNaシリンジ 10単位</div>

■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量	
ジェムザール	1000 mg/m ²	mg/Body
カルボプラチン	AUC= 4	mg/Body

■注意・確認事項

○ジェムザール投与は30分前後で投与する。(60分以上かかると副作用が増強した例が報告されている。)

入力 薬剤師	看護師	看護師