

■エンボス

ジェムザール+カルボプラチン療法(Day8,15)

【泌尿器科】30-8,15【尿路上皮癌】

(第 コース目)

*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:
医師名:	印

身長:	cm	体重:	kg
体表面積:	m ²	Cr:	mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 4週ごとを1コースとする

Day	1	2	8	15	22	~28
施行日	/	/	/	/		
ジェムザール	↓	休薬	↓	↓	休薬	
カルボプラチン	休薬	↓	休薬	休薬	休薬	

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

滴下順				
①	<table border="1"> <tr> <td>デキサート注6.6mg 1V</td> <td rowspan="2">30分</td> </tr> <tr> <td>生食 100mL</td> </tr> </table>	デキサート注6.6mg 1V	30分	生食 100mL
デキサート注6.6mg 1V	30分			
生食 100mL				
②	<table border="1"> <tr> <td>●ジェムザール【 】mg</td> <td rowspan="2">30分</td> </tr> <tr> <td>生食 100mL</td> </tr> </table>	●ジェムザール【 】mg	30分	生食 100mL
●ジェムザール【 】mg	30分			
生食 100mL				
③	<table border="1"> <tr> <td>生食 50mL</td> <td>10分フラッシュ</td> </tr> </table>	生食 50mL	10分フラッシュ	
生食 50mL	10分フラッシュ			

■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量	
ジェムザール	1000 mg/m ²	mg/Body
カルボプラチン	AUC= 4	mg/Body

■注意・確認事項

○ジェムザール投与は30分前後で投与する。(60分以上かかると副作用が増強した例が報告されている。)

入力 薬剤師	看護師	看護師