

BEP療法 (Day9,16)

【婦人科】31-9,16【卵巣癌】

(第 コース目)

*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:
医師名:	

身長:	cm	体重:	kg
体表面積:	m ²	Cr:	mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール :3週ごとを1コースとする

Day	1	2	3	4	5	6	7	9	16	~21
施行日	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ベブシド	↓	↓	↓	↓	↓	休薬	休薬	休薬	休薬	
ランダ	↓	↓	↓	↓	↓	休薬	休薬	休薬	休薬	
ブレオ	休薬	↓	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬	↓	↓	

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

滴下順	
①	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> デキサート注6.6mg 1V 生食 50mL </div> ↓ 10分
②	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> ●ブレオ ()mg 生食 100mL </div> ↓ 1時間
③	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 生食 50mL </div> ↓ 10分 フラッシュ

■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量	
ベブシド	100 mg/m ²	mg/Body
ランダ	20 mg/m ²	mg/Body
ブレオ	mg/m ²	30mg/Body

■注意・確認事項

入力 薬剤師	看護師	看護師