

# TEC療法

## 【婦人科】40【子宮体癌】


### (第 コース目)

診療科:	病棟:
医師名:	印
身長: cm	体重: kg
体表面積: m <sup>2</sup>	Cr: mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 3週ごとを1コースとする

Day	1	8	15	~21
施行日	/	/	/	
エピルビシン	↓	休薬	休薬	
パクリタキセル	↓	休薬	休薬	
カルボプラチン	↓	休薬	休薬	

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり



■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量		※エピルビシンの総投与量に留意すること。 (エピルビシンとして800mg/m <sup>2</sup> 以上で心機能異常の危険性)
エピルビシン	50 mg/m <sup>2</sup>	mg/Body	
パクリタキセル	150 mg/m <sup>2</sup>	mg/Body	
カルボプラチン	AUC=4	mg/Body	

入力 薬剤師	看護師	看護師

■注意・確認事項

- パクリタキセル投与中はアレルギー発現に注意すること。特に投与開始10分以内は頻回に観察すること。
- 過敏症予防の前投薬を終了して30分以上経っているのを確認してからパクリタキセルを投与すること。
- 点滴セットはフィルター付き輸液ルートを使用すること。