

ジェムザール+タルセバ療法

【内科】40【膀胱癌】

(第 コース目)

*網かけ部分は必須記入事項

| | |
|----------------------|-----------|
| 診療科: | 病棟: |
| 医師名: | 印 |
| 身長: cm | 体重: kg |
| 体表面積: m ² | Cr: mg/dL |

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 4週ごとを1コースとする

| | | | | | |
|--------|----------|---|----|----|-----|
| Day | 1 | 8 | 15 | 22 | ~28 |
| 施行日 | / | / | / | / | |
| ジェムザール | ↓ | ↓ | ↓ | 休薬 | |
| タルセバ | 経口: 連日投与 | | | | |

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

| | |
|-----|-----------------------------------|
| 滴下順 | |
| ① | デキサート注6.6mg 1V 生食 100mL 30分 |
| ② | ●ジェムザール【 】mg 生食 100mL 30分 |
| ③ | 生食 50mL 10分フラッシュ |

■投与量 ※投与量の参考

| 薬剤名 | 標準投与量 | |
|--------|-----------------------|------------|
| ジェムザール | 1000mg/m ² | mg/Body |
| タルセバ | | 100mg/Body |

■注意・確認事項

○ジェムザール投与は30分前後で投与する。(60分以上かかると副作用が増強した例が報告されている。)

| | | |
|-----------|-----|-----|
| 入力 薬剤師 | 看護師 | 看護師 |
| | | |