

# バベンチオ+インライタ療法

■エンボス

【泌尿器科】42【腎細胞癌】

(第 コース目)

\*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:
医師名:	印

身長:	cm	体重:	kg
体表面積:	m <sup>2</sup>	Cr:	mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール :2週ごとを1コースとする

Day	1	8	~14
施行日	/	/	/
バベンチオ	↓	休薬	休薬
インライタ	経口:Day1~連日投与		

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

滴下順			
①	<table border="1"> <tr> <td>ポララミン注5mg 1A アセリオ点滴静注 1000mg</td> <td>15分</td> </tr> </table>	ポララミン注5mg 1A アセリオ点滴静注 1000mg	15分
ポララミン注5mg 1A アセリオ点滴静注 1000mg	15分		
②	<table border="1"> <tr> <td>生食 50mL</td> <td>15分</td> </tr> </table>	生食 50mL	15分
生食 50mL	15分		
③	<table border="1"> <tr> <td>●バベンチオ【      】mg 生食 250mL</td> <td>1時間</td> </tr> </table>	●バベンチオ【      】mg 生食 250mL	1時間
●バベンチオ【      】mg 生食 250mL	1時間		
④	<table border="1"> <tr> <td>生食 50mL</td> <td>10分 フラッシュ</td> </tr> </table>	生食 50mL	10分 フラッシュ
生食 50mL	10分 フラッシュ		

■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量	
バベンチオ	10mg/kg	mg/body
インライタ	5mg 1日2回(開始用量)	

■注意・確認事項

- 点滴ルートはフィルター付き輸液ルートを使用すること。
- 外来から初回導入となる場合は、インフュージョンリアクションの観察の為、点滴終了1時間後に医師の診察を受け、帰宅の許可を得ること。
- インライタは、1回5mg1日2回を開始用量とし、増量又は減量については添付文書を参照すること。

入力 薬剤師	看護師	看護師