

GEM+CDDP療法(Day2)

【泌尿器科】⑤-2【尿路上皮癌】 (第 コース目)

*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:		
医師名:	印		
身長:	cm	体重:	kg
体表面積:	m ²	Cr:	mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 3週ごとを1コースとする

Day	1	2	3	8	15	~21
施行日	/	/	/	/	/	
ジェムザール	↓	休薬	休薬	↓	↓	
ランダ	休薬	↓	休薬	休薬	休薬	

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

滴下順	
①	アロカリス注235mg 1V パロノセトロン注0.75mg 1V デキサート注1.65mg 2A デキサート注6.6mg 1V 生食 100mL 30分
②	KCL注10mEq 硫酸Mg補正液1mEq/mL 8mL 生食 500mL 1時間
③	マンニトールS 300mL 30分
④	●ランダ【 】mg 生食 500mL 1時間
⑤	KCL注10mEq 生食 500mL 1時間
⑥	ヘパリンNaシリンジ 10単位

■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量	
ジェムザール	1000 mg/m ²	mg/Body
ランダ	70 mg/m ²	mg/Body

■注意・確認事項

○腎機能に応じて、副作用軽減のために点滴を追加すること。

○デカドロン錠8mg(内服オーダ)はday3,4,5に投与する。

○糖尿病でないことを確認し、必要に応じてジプレキサ錠5mg(内服オーダ)をday2,3,4,5に投与する。

入力 薬剤師	看護師	看護師