

# GEM+CDDP療法(Day3)

## 【泌尿器科】⑤-3【尿路上皮癌】

### (第 コース目)

\*網かけ部分は必須記入事項

診療科:		病棟:	
医師名:		印	
身長:	cm	体重:	kg
体表面積:	m <sup>2</sup>	Cr:	mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 3週ごとを1コースとする

Day	1	2	3	8	15	~21
施行日	/	/	/	/	/	
ジェムザール	↓	休薬	休薬	↓	↓	
ランダ	休薬	↓	休薬	休薬	休薬	

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

滴下順	
①	ソリューゲンF注 500mL 3時間
②	ソルラクト 500mL 3時間
③	ソリューゲンF注 500mL 3時間
④	ソルラクト 500mL 3時間

■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量	
ジェムザール	1000 mg/m <sup>2</sup>	mg/Body
ランダ	70 mg/m <sup>2</sup>	mg/Body

■注意・確認事項

○腎機能に応じて、副作用軽減のために点滴を追加すること。

○デカドロン錠8mg(内服オーダ)はday3,4,5に投与する。

○糖尿病でないことを確認し、必要に応じてジプレキサ錠5mg(内服オーダ)をday2,3,4,5に投与する。

入力 薬剤師	看護師	看護師