

[short hydration(適応:75歳未満)]

■エンボス

ランダ+ロゼウス+RT(SH)療法(Day1)

【呼吸器科】59-1【非小細胞肺癌】

(第 コース目)

*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:
医師名:	印

身長:	cm	体重:	kg
体表面積:	m ²	Cr:	mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 4週ごとを1コースとする

Day	1	8	15	22	~28
施行日	/	/	/	/	/
ランダ	↓	休薬	休薬	休薬	
ロゼウス	↓	↓	休薬	休薬	

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

滴下順		
※①		生食 500mL 4時間
※①		アロカリス注235mg 1V パロノセトロン注0.75mg 1V デキサート注1.65mg 2A デキサート注6.6mg 1V 生食 100mL 30分
②		●ロゼウス【 】mg 生食 50mL 全開(5分)
③		KCL注10mEq 硫酸Mg補正液1mEq/mL 8mL 生食 500mL 1時間
④		マンニトールS 300mL 30分
⑤		●ランダ【 】mg 生食 500mL 1時間
⑥		KCL注10mEq 生食 500mL 1時間

■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量	
ランダ	80mg/m ²	/Body
ロゼウス	20mg/m ²	mg/Body

入力 薬剤師	看護師	看護師

■注意・確認事項

- 75歳未満の患者を対象とする。
- 静脈炎予防の為にロゼウス投与直後より生理食塩水(200mL以上)にてフラッシュを開始する。
- 腎機能に応じて、副作用軽減のために点滴を追加すること。

○デカドロン錠8mg(内服オーダ)はday2,3,4に投与する。

○糖尿病でないことを確認し、必要に応じてジプレキサ錠5mg(内服オーダ)をday1,2,3,4に投与する。