

Weeklyランダ療法(動注)(Day2)

■エンボス

【歯科】⑥-2【頭頸部癌】 (第 コース目)

*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:
医師名:	印
身長: cm	体重: kg
体表面積: m ²	Cr: mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 1週ごとを1コースとする

Day	1	2	3	4	~7
施行日	/	/	/	/	
ランダ	休薬	↓	休薬	休薬	

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

滴下順	【末梢ルート】	【動注】
①	ソリューゲンF 500mL 1時間30分	
②	アロカリス注235mg 1V デキサート注6.6mg 1V デキサート注1.65mg 2A パロノセトロン注0.75mg 1V 生食 500mL 1時間30分	
③	ソリューゲンF 500mL 3時間	
※④	側管より デトキソール静注 9V(20mL/V) 生食500mL 450mL 1時間30分	●ランダ()mg 30分
⑤		ソル・コーテフ注 500mg
⑥	生食 500mL 1時間	
⑦	マンニトールS 300mL 1時間	
⑧	ソリューゲンF 500mL 1時間	

■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量
ランダ	100mg/m ² mg/Body

■注意・確認事項

○デトキソール静注は、ランダ注と同時刻に末梢ルートで点滴静注すること。

○デカドロン錠8mg(内服オーダ)はday3,4,5に投与する。

○糖尿病でないことを確認し、必要に応じてジプレキサ錠5mg(内服オーダ)をday2,3,4,5に投与する。

入力薬剤師	看護師	看護師