

[short hydration(適応:75歳未満)]

■エンボス

ランダ+ベプシド療法(Day2,3)

【呼吸器科】62-2,3【小細胞肺癌】

(第 コース目)

*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:
医師名:	印

身長:	cm	体重:	kg
体表面積:	m ²	Cr:	mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール :3~4週ごとを1コースとする

Day	1	2	3	~21or28
施行日	/	/	/	
ランダ	↓	休薬	休薬	
ベプシド	↓	↓	↓	

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

滴下順	
①	生食 50mL 10分
②	●ベプシド【 】mg 生食 500mL 1時間
③	生食 50mL 10分 フラッシュ

■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量	
ランダ	80 mg/m ²	mg/Body
ベプシド	100 mg/m ²	mg/Body

入力 薬剤師	看護師	看護師

■注意・確認事項

- 75歳未満の患者を対象とする。
- ベプシド注は投与量が200mg(0.4mg/mL)を超えると結晶が析出することがある。
- 腎機能に応じて、副作用軽減のために点滴を追加すること。
- デカドロン錠8mg(内服オーダ)はday2,3,4に投与する。
- 糖尿病でないことを確認し、必要に応じてジプレキサ錠5mg(内服オーダ)をday1,2,3,4に投与する。