

サイラムザ療法【30分】

【内科】67【肝細胞癌】

(第 コース目)

*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:
医師名:	印

身長:	cm	体重:	kg
体表面積:	m ²	Cr:	mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 2週ごとを1コースとする

Day	1	8	~14
施行日	/	/	
サイラムザ	↓	休薬	

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

滴下順	
①	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> ポララミン注 1A 生食 50mL </div> <div style="text-align: right;">10分</div>
②	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> ●サイラムザ【 】mg 生食 250mL </div> <div style="text-align: right;">30分</div>
③	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 生食 50mL </div> <div style="text-align: right;">10分フラッシュ</div>

■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量
サイラムザ	8 mg/kg

■注意・確認事項

- 点滴セットはフィルター付き輸液ルートを使用すること。
- がん化学療法後に増悪した血清AFP値が400ng/mL以上の切除不能な肝細胞癌に対して使用すること。
- サイラムザは初回投与の忍容性が良好であれば、2回目以降の投与時間は30分まで短縮できる。

入力 薬剤師	看護師	看護師