

# Avastin+ドキシル療法 (Day15)【30分】

## 【婦人科】74-15【再発卵巣癌】

### (第 コース目)

\*網かけ部分は必須記入事項

|      |     |
|------|-----|
| 診療科: | 病棟: |
| 医師名: | 印   |

|       |                |     |       |
|-------|----------------|-----|-------|
| 身長:   | cm             | 体重: | kg    |
| 体表面積: | m <sup>2</sup> | Cr: | mg/dL |

### ■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 4週ごとを1コースとする

|       |   |    |    |    |     |
|-------|---|----|----|----|-----|
| Day   | 1 | 8  | 15 | 22 | ~28 |
| 施行日   | / | /  | /  | /  |     |
| ドキシル  | ↓ | 休薬 | 休薬 | 休薬 |     |
| アバステン | ↓ | 休薬 | ↓  | 休薬 |     |

### ■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

| 滴下順 |                              |          |
|-----|------------------------------|----------|
| ①   | 生食 50mL                      | 10分      |
| ②   | ●アバステン【      】mg<br>生食 100mL | 30分      |
| ③   | 生食 50mL                      | 10分フラッシュ |

### ■投与量 ※投与量の参考

| 薬剤名   | 標準投与量                |         |
|-------|----------------------|---------|
| ドキシル  | 40 mg/m <sup>2</sup> | mg/Body |
| アバステン | 10 mg/kg             |         |

### ■注意・確認事項

- アバステンは初回投与の忍容性が良好であれば、2回目の投与は60分間で行っても良い。
- 2回目の投与においても忍容性が良好であれば、それ以降の投与は30分間投与とすることができる。
- アバステンとブドウ糖溶液を混合した場合、アバステンの力価の減弱が生じるおそれがあるため、ブドウ糖溶液との混合を避け、アバステンとブドウ糖溶液の同じ点滴ラインを用いた同時投与は行わないこと。

|           |     |     |
|-----------|-----|-----|
| 入力<br>薬剤師 | 看護師 | 看護師 |
|           |     |     |