

# IRIS療法

## 【外科】88【進行性・再発大腸癌】

### (第    コース目)

\*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:
医師名: <span style="float: right;">印</span>	

身長: <span style="float: right;">cm</span>	体重: <span style="float: right;">kg</span>
体表面積: <span style="float: right;">m<sup>2</sup></span>	Cr: <span style="float: right;">mg/dL</span>

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 4週ごとを1コースとする

Day	1	8	15	22	~28
施行日	/	/	/	/	/
エスワン	経口: Day1-14				
カンプト	↓	休薬	↓	休薬	休薬

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

滴下順		
①		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">                     アロカリス注235mg 1V                      デキサート注1.65mg 2A                      グラニセトンバッグ 100mL                 </div> <span style="float: right;">30分</span>
②		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">                     ●カンプト注【    】mg                      5%ブドウ糖 250mL                 </div> <span style="float: right;">1時間30分</span>
③		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">                     生食 50mL                 </div> <span style="float: right;">10分フラッシュ</span>

■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量	※エスワンの1日投与量
エスワン	※参照	BSA<1.25m <sup>2</sup> 80mg/日 分2
カンプト注	100 mg/m <sup>2</sup> mg/Body	1.25m <sup>2</sup> ≤ BSA < 1.5m <sup>2</sup> 100mg/日 分2 1.5m <sup>2</sup> ≤ BSA                    120mg/日 分2

■注意・確認事項

○カンプトは腸閉塞患者には禁忌。

入力 薬剤師	看護師	看護師