

テセントリク療法【60分】

【呼吸器科】88【非小細胞肺癌】

(第 コース目)

*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:
医師名:	印

身長:	cm	体重:	kg
体表面積:	m ²	Cr:	mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 3週ごとを1コースとする

Day	1	8	15	~21
施行日	/	/	/	/
テセントリク	↓	休薬	休薬	

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

滴下順	
①	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">生食 50mL</div> <div style="text-align: right;">10分</div>
②	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">●テセントリク注【 】mg</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">生食 250mL</div> <div style="text-align: right;">1時間</div>
③	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">生食 50mL</div> <div style="text-align: right;">10分フラッシュ</div>

■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量
テセントリク注	1200mg/body

■注意・確認事項

- 点滴セットはフィルター付き輸液ルートを使用すること。
- 初回投与の忍容性が良好であれば、2回目以降の投与時間は30分間まで短縮できる。
- 外来から初回導入となる場合は、インフュージョンリアクションの観察の為、点滴終了1時間後に医師の診察を受け、帰宅の許可を得ること。

入力 薬剤師	看護師	看護師