

キイトルーダ+ペメトレキセド+ランダ (SH) 療法

**【呼吸器科】92【非小細胞肺癌】
(第 コース目)**

*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:		
医師名:	印		
身長:	cm	体重:	kg
体表面積:	m ²	Cr:	mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 3週ごとを1コースとする

Day	-8	1	2	3	~21
施行日	/	/	/	/	/
キイトルーダ		↓	休薬	休薬	
ペメトレキセド		↓	休薬	休薬	
ランダ		↓	休薬	休薬	
パンピタン末(経口)	初回投与の7日以上前から薬酸として1日1回0.5mgを連日経口投与する。				
メコバラミン注(筋注)	↓				

メコバラミン注(ビタミンB12): 初回投与の少なくとも7日前に、1回1mgを筋肉内投与する。その後、9週毎(3コース毎)に1回投与する。

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

滴下順	内容	時間
①	アロカリス注235mg 1V パロノセトロン注0.75mg 1V デキサート注1.65mg 2A デキサート注6.6mg 1V 生食 100mL	30分
②	●キイトルーダ【 】mg 生食 50mL	30分
③	生食 50mL	10分
④	●ペメトレキセド【 】mg 生食 100mL	10分
⑤	KCL注10mEq 硫酸Mg補正液1mEq/mL 8mL 生食 500mL	1時間
⑥	マンニトールS 300mL	30分
⑦	●ランダ【 】mg 生食 500mL	1時間
⑧	KCL注10mEq 生食 500mL	1時間

■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量
キイトルーダ	200mg/Body
ペメトレキセド	500 mg/m ² mg/Body
ランダ	75 mg/m ² mg/Body

入力 薬剤師	看護師	看護師

■注意・確認事項

- 75歳未満の患者を対象とする。
- 点滴セットはフィルター付き輸液ルートを使用すること。
- NSAIDsとの併用は注意して下さい。
- 1週間以上前から薬酸を服用していること、ビタミンB12の筋肉内注射投与を受けたことを確認すること。
- 腎機能に応じて、副作用軽減のために点滴を追加すること。
- デカドロン錠8mg(内服オーダ)はday2,3,4に投与する。
- 糖尿病でないことを確認し、必要に応じてジプレキサ錠5mg(内服オーダ)をday1,2,3,4に投与する。