

# キイトルーダ<sup>®</sup>+ペムトレキセド<sup>®</sup>療法

## 【呼吸器科】93【非小細胞肺癌】

### (第 コース目)

\*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:
医師名:	印
身長: cm	体重: kg
体表面積: m <sup>2</sup>	Cr: mg/dL

### ■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール :3週ごとを1コースとする

Day	-8	1	8	15	~21
施行日	/	/	/	/	/
キイトルーダ		↓	休薬	休薬	
ペムトレキセド		↓	休薬	休薬	
パンビタン末(経口)	初回投与の7日以上前から葉酸として1日1回0.5mgを連日経口投与する。				
メコバラミン注(筋注)	↓				

メコバラミン注(ビタミンB12): 初回投与の少なくとも7日前に、1回1mgを筋肉内投与する。その後、9週毎(3コース毎)に1回投与する。

### ■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

滴下順	
①	デキサート注6.6mg 1V 生食 100mL 30分
②	●キイトルーダ【 】mg 生食 50mL 30分
③	生食 50mL 10分
④	●ペムトレキセド【 】mg 生食 100mL 10分
⑤	生食 50mL 10分 フラッシュ

### ■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量
キイトルーダ	200mg/Body
ペムトレキセド	500 mg/m <sup>2</sup> mg/Body

薬剤師	看護師	看護師

### ■注意・確認事項

○点滴セットはフィルター付き輸液ルートを使用すること。

○NSAIDsとの併用は注意して下さい。

○1週間以上前から葉酸を服用していること、ビタミンB12の筋肉内注射投与を受けたことを確認すること。