

# アービタックス＋Weeklyカンプト療法【Day8～22】

## 【外科】96-8,15,22【進行・再発大腸癌】

### (第 コース目)

\*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:
医師名:	印

身長:	cm	体重:	kg
体表面積:	m <sup>2</sup>	Cr:	mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 6週ごとを1コースとする

Day	1	8	15	22	29	36	~42
施行日	/	/	/	/	/	/	
アービタックス	↓	↓	↓	↓	↓	休薬	
カンプト	↓	↓	↓	↓		休薬	

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

滴下順	
①	アロカリス注235mg 1V デキサート注1.65mg 2A ポラミン注5mg 1A 生食 100mL 30分
②	●アービタックス【      】mg 生食 250mL 1時間
③	グラニセトンバッグ 100mL 30分
④	●カンプト【      】mg 5%ブドウ糖液 250mL 1時間30分
⑤	生食 50mL 10分フラッシュ

■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量	
アービタックス(初回)	400mg/m <sup>2</sup>	mg/Body
アービタックス(2回目以降)	250mg/m <sup>2</sup>	mg/Body
カンプト	100mg/m <sup>2</sup>	mg/Body

入力 薬剤師	看護師	看護師

■注意・確認事項

- アービタックス投与中又は24時間以内にinfusion reactionが起こる場合があるので注意すること。
- アービタックスは1コース目の初回のみ400mg/m<sup>2</sup>で投与。それ以降は250mg/m<sup>2</sup>で投与。
- カンプトは腸閉塞傾向の患者には禁忌。